

**PROTOCOLE D'ADAPTATION DES DOSES D'INSULINE
EN FONCTION DES GLYCEMIES PREPRANDIALES**

Saisi par :

Date :

INSULINE Glycémie (en g/l)	PETIT DEJEUNER	DEJEUNER	DINER
Si dextro inférieur à :	unités	unités	unités
Si dextro entre et	unités	unités	unités
Si dextro entre et	unités	unités	unités
Si dextro entre et	unités	unités	unités
Si dextro entre et	unités	unités	unités
Si dextro supérieur à	unités	unités	unités
Si hypoglycémie hier dans les 4 heures qui suivent l'injection du petit déjeuner	-2 unités (sur toute cette colonne)		
Si hypoglycémie hier dans les 4 heures qui suivent l'injection du déjeuner		-2 unités (sur toute cette colonne)	
Si hypoglycémie hier dans les 4 heures qui suivent l'injection du dîner			-2 unités (sur toute la colonne)
Si hyperglycémie 2 jours consécutifs dans les 4 heures qui suivent l'injection du petit déjeuner	+ 2 unités (sur toute cette colonne)		
Si hyperglycémie 2 jours consécutifs dans les 4 heures qui suivent l'injection du déjeuner		+ 2 unités (sur toute cette colonne)	
Si hyperglycémie 2 jours consécutifs dans les 4 heures qui suivent l'injection du dîner			+2 unités (sur toute la colonne)